


Sífilis, continua aumentando

Como é a doença?

É uma doença infecciosa causada por *Treponema pallidum*. Infecta-se por relação sexual, através das membranas ou pequenos ferimentos da pele. Como quase não tem sintoma, a doença vai avançando sem que a pessoa perceba. E sem perceber, acaba contagiando outras pessoas. Mais ou menos um mês depois da infecção, aparecem erupções cutâneas e nódulos no local infectado, como órgãos genitais, ânus, boca, etc., mas esses sintomas desaparecem naturalmente após algumas semanas mesmo sem ter feito nenhum tratamento. E sem que a pessoa perceba, a doença progride silenciosamente e alguns anos ou algumas décadas de anos depois podem aparecer anormalidades no coração, vaso sanguíneo ou desordem neurológica. Podem às vezes chegar a perder a vista ou ficar com demência (transtorno neurocognitivo maior). Quando a gestante contrair sífilis, pode haver transmissão ao feto através da placenta, resultando em natimorto, parto prematuro, morte neonatal, doença congênita (sífilis congênita), etc.

Quanto está aumentando?

Entre os anos de 2016 a 2020, estava oscilando por volta de 1.700 casos por ano, mas em 2022, foram relatados 3.400 casos no período de 48 semanas, isto é, o número de casos tem-se dobrado, registrando um novo recorde histórico.



Como se transmite?

A infecção ocorre por meio de relação sexual, através de pequenos cortes de ferida ou membrana, ao ter contato direto com sangue ou secreções corporais (sêmen, secreção vaginal, etc.) que contêm patógenos.

As pessoas podem ser infectadas por sífilis várias vezes e podem transmitir para outras pessoas sem perceber.

Como prevenir?

O uso correto de preservativo (camisinha) é efetivo para a prevenção. A infecção ocorre também por sexo oral ou sexo anal. É muito importante o uso correto de preservativo (camisinha), para prevenir a infecção. Submeta-se ao exame sempre que tiver preocupação.

Sífilis - perguntas e respostas

P Pode curar-se naturalmente (sem tratamento)?

R Mesmo sendo infectada por sífilis, a pessoa pode às vezes não ter sintomas, ou não sentir dor apesar do aparecimento de sintomas na pele. O sintoma pode desaparecer sem ter feito tratamento, mas isso não significa que tenha curado naturalmente. É necessário fazer o tratamento com antibiótico. Em caso de medicamento via oral, deve ser tomada grande dose de remédio cada vez, por um período prolongado.

Mas tendo sido aprovada a injeção intramuscular de penicilina, temos atualmente uma nova alternativa além da administração oral. Se for logo depois da detecção do contágio, é possível a cura somente com uma vez de injeção. Isso é um ponto vantajoso em comparação com a administração oral.

Se deixar de fazer o tratamento, pode acarretar grandes problemas no sistema nervoso ou no coração. Por isso é muito importante fazer o exame e tratamento na fase inicial.

P Se se contagiar uma vez, não se contagia de novo?

R A infecção por sífilis é diagnosticada pelo médico através do exame de verificação de anticorpos no sangue. No sangue da pessoa infectada é detectada uma determinada quantidade de anticorpos, mas isso não chega a prevenir a reinfeção. Assim, a pessoa pode infectar-se novamente, caso não tomar medidas adequadas de prevenção, como o uso de preservativo (camisinha), tratamento do parceiro, etc.

P Não se contagia se usar o preservativo (camisinha)?

R O uso de camisinha para evitar o contato direto da parte infeccionada com a membrana ou pele é efetivo para a prevenção de contágio. Entretanto, não podemos dizer que o uso de camisinha previne 100 % de infecção, porque pode ocorrer contágio através da parte da pele não envolvida pela camisinha. Recomendamos que se submetam ao exame, porque pode estar infectado(a) mesmo que não tenha sintoma.

P Pode ser feito o exame?

R Caso tiver sintoma, consulte uma instituição médica.

Você pode fazer o exame de HIV e sífilis gratuitamente e anonimamente, nos Centros de Saúde e Laboratórios de exames existentes em Tóquio.

Em certos Centros de Saúde, podem fazer também exames de outras infecções sexualmente transmissíveis (IST), como a Clamídia e Gonorreia.

O exame de sífilis é realizado tirando amostra de sangue.

P Estou preocupado(a) de ter-me contagiado com sífilis. Onde posso pedir a consulta?

R Você pode pedir consulta no Centro de Saúde da área em que reside. E se você já estiver com sintoma, procure uma instituição médica.